

「健康に関する情報提供のお願い」についての Q & A

Q 入力したものが送信されたか不明。もしくは送られて来ない。

A ・@google.comからのメールを受け取れるようにする。
・入力したメールアドレスに間違いがないか。
・回答したコピーが指定したメールアドレスに届いているか確認する。
・回答したコピーが指定したメールアドレスに届いていない場合。
→もう一度入力する。

Q 情報を追加もしくは修正したい。

A 指定したメールアドレスへ送信された Google フォームを開き、「回答を編集」ボタンをクリック後、追加修正し送信する。

Q すでに入力したが、予防接種を追加する場合はどうしたよいか。

A 回答修正可能なフォーマットになっているため、アクセスして入力する。

Q 期限内に回答し忘れた。

A 気付いた時点で回答する。

Q 予防接種を受けたかわからない（受けた日付がわからない）。

A 母子手帳で確認する。分からないところは空欄で回答する。

Q 幼少期にアレルギーや小児喘息があったが、今は症状が無い場合回答は必要か。

A 今は無い症状でも回答を入力する。

Q 麻疹・風疹・水痘・ムンプスのワクチンは、それぞれ2回受けることがすすめられているが、1回しか打っていないワクチンがある。抗体価を調べてから2回目を打った方が良いか。

A 抗体価の測定は必須ではないので、抗体価測定なしで2回目を打ったほうが良い。

Q 髄膜炎菌ワクチンとは何か。

A 例； 商品名：メナクトラ 接種回数：1回
https://www.vaccine4all.jp/topics_I-detail.php?tid=34

Q 髄膜炎菌ワクチンは接種した方が良いか。

A 学生寮に入る予定の方や集団生活を送る方など、侵襲性髄膜炎菌感染症予防のためにワクチン接種を受けておくことを推奨する。

※参照：【よくわかる髄膜炎菌】

QR コード：



Q コロナワクチンと他のワクチンを接種する場合の間隔は何日か。

A インフルエンザワクチン以外の場合は2週間以上空ける。
インフルエンザワクチンはコロナワクチンとの間隔について規定なし（同時接種も可能）。
<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0037.html>

※参照：【コロナワクチン以外の接種間隔について】 QR コード：



Q & A for “Request for provision of health-related information”

Q I am not sure if what I entered was sent or not.

A

- Make sure that you can receive emails from @google.com.
- Is there a mistake in the email address you entered?
- Check if a copy of your response has been sent to the specified email address.
- If the reply copy has not arrived at the specified email address, enter again.

Q I would like to add or correct information.

A Open a Google form sent to the specified email address.
After clicking the “Edit Answer 編集” button, make additional corrections and send.

Q What should I do if I have already sent the answer but I will add a vaccination?

A Access and enter the modified answer after the vaccination.

Q I forgot to answer within the deadline.

A Please answer immediately when you notice.

Q I do not know if I have been vaccinated. / I do not know the date of vaccination.

A Check the maternity record book. Leave blank if you do not know.

Q If I had allergies or asthma in my childhood but I have no symptoms now, do I need to answer?

A Answer the disease name and when you had that disease, even if you don't have symptoms now.

Q It is recommended to receive two doses of each of the measles, rubella, chickenpox, and mumps vaccines, but there are some vaccines that are given only once. Is it better to inject the second time after checking the antibody titer?

A Antibody titer measurement is not required, so it is better to take the second shot without antibody titer measurement.

Q What is meningococcal vaccine?

A Example Product name: Menactra, Number of vaccination: 1 time
<https://www.menactra.com/>

Q Should I get the meningococcal vaccine?

A Those who plan to live in a student dormitory or live in a group are recommended to be vaccinated in order to prevent invasive meningococcal disease.

※Reference: [Learn more about meningococci]

QR code:



Q How many days do I need between the injections of corona vaccine and other vaccines?

A For vaccines other than influenza, you need more than 14 days.
For influenza vaccine, you do not need inoculation interval.

※Reference: [Inoculation interval other than corona vaccine] QR code :

